GNZ 2005

Estabilidade de produção

CONVENCIONAL

Redutor *Pratylenchus*

BENEFÍCIOS

- Redutor de *pratylenchus*
- Rusticidade para fechamento de plantios
- Amplitude de semeadura
- Boa tolerância a seca
- Qualidade de grãos

REAÇÃO A DOENÇAS

	- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +
Phaeosphaeria	● ● ● ● ● ●
Cercosporiose	● ● ● ● ● ●
Helmintosporiose	● ● ● ● ● ● ●
Mancha Bipolaria	● ● ● ● ● ●
Ferrugem Branca	● ● ● ● ● ● ●
Ferrugem Comum	● ● ● ● ● ●
Ferrugem Polissora	● ● ● ● ● ●
Mancha de Diplodia	● ● ● ● ● ●
Antracnose de Colmo	● ● ● ● ● ● ●
Molicutes	● ● ● ● ● ●
Viroses	● ● ● ● ● ● ●
Fusarium	● ● ● ● ● ●
Estria Bacteriana (Xanthomonas vasícola)	SI

Notas: 9 = alta tolerância / 1 = suscetível
A reação à doenças podem sofrer variações em função do ambiente e ocorrência de forte pressão do patógeno

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS

Tecnologia Recomendada
MÉDIA

Finalidade de uso
GRÃOS

Tipo de grão
SEMI DURO / ALARAJANDO

Época de Plantio
VERÃO/SAFRINHA

Arquitetura Foliar
SEMI ERETA

Maturidade Relativa em dias (rm)
132

Tolerância a Nicosulfuron
SIM

Empalhamento
FECHADO

RECOMENDAÇÕES DE PLANTIO

VERÃO

REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS	SETEMBRO 1 2 3 4	OUTUBRO 1 2 3 4	NOVEMBRO 1 2 3 4	DEZEMBRO 1 2 3 4
RS/SC/PR (Baixo)			65	
RS/SC/PR (Alto)			65	
MG/SP			60	
GO/DF			60	
BA			60	
TO			60	
MA/PI			60	
Nordeste*****		50-60		

* Semente por hectare.
** Atenção especial ao controle da cigarrinha-do-milho, inseto vetor de espiroplasma e fitoplasma, causadores dos enfezamentos pálido e vermelho respectivamente.
*** Responde ao uso de fungicidas.
**** Não posicionar em áreas de baixa fertilidade e manejo deficiente. Seu uso isolado como única ferramenta de manejo, não garante a redução do neumatoide *pratylenchus* na soja.
***** Época ideal de plantio de abril a junho, demais épocas sob consulta técnica.

SAFRINHA

REGIÕES EDAFOCLIMÁTICAS	JANEIRO 1 2 3 4	FEVEREIRO 1 2 3 4	MARÇO 1 2 3 4
PR (Oeste)/MS (Sul)	Sob consulta	55-60	55 | NR
PR (Alto)	Sob consulta	55-60	55 | NR
PR (Norte)/SP (Sul)	Sob consulta	55-60	55 | NR
GO/DF (Alto)	Sob consulta	55-60 | 50-55	NR
MG	Sob consulta	55-60 | 50-55	NR
GO (Baixo)	Sob consulta	55-60 | 50-55	NR
MT/RO	Sob consulta	55-60 | 50-55	NR
MATOPIBA	Sob consulta	55-60 | 50-55	NR

NR = Não Recomendado